

Прививка — единственная защита

Полиомиелит — очень заразное заболевание, которое приводит к параличу или смерти. Лекарств от полио не существует.



Минимум четыре прививки

Зашедший налог тут ребёнок, который получил Минимум четыре дозы вакцины от полиомиелита. Вакцины от полио бывают двух видов: инактивированной (интактивированная) и ослабленной (живой).



Начинаем с ИПВ-вакцины

Две первые прививки делают вакциной ИПВ (интактивированная антигены). Это инактивированная вакцина с ослабленными убитыми вирусами полиомиелита, которая обеспечивает антитела в мозге и крови. Может использоваться как моновакцина, так и в составе комбинированной инактивированной вакцины (то есть против нескольких болезней сразу).



Наверстывайте пропущенное

Если ваш ребёнок пропустил прививки по какой-либо причине, не нужно начинать вакцинацию заново. Просто составьте с врачом график введения тех доз, которых не хватает.



Дополнительные обследования и подготовка не нужны

Перед началом вакцинации не нужно делать дополнительные обследования (эндоскопию, анализы крови или мочи, «иммунограмму» и т.д.). Для подготовки к вакцинации не рекомендуется принимать медикаменты (жаропонижающие, противоаллергические), не нужно детям или краине-либо изменение в обычном режиме ребенка.



Реакция на вакцину — это нормально

Повышенная температура тела, срыг, насморк, раздражительность — все это возможные и нормальные реакции организма на вакцину. Они означают, что вакцина действует, эти реакции исчезнут без последствий для здоровья. Если вас что-то беспокоит, посоветуйтесь со своим доктором.



Хронические заболевания — не противопоказание

Если у вашего ребёнка есть хронические заболевания (например, бронхиальная астма, диабет) — это не противопоказание к прививке. Наоборот: дети с хроническими заболеваниями — более уязвимы, поэтому им вакцинация крайне необходима!

